



TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO DE MORDIDA ABIERTA ANTERIOR EN PACIENTE ADULTO: REPORTE DE CASO.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE ODONTOLÓGICA Y ODONTOPEDIAS DENTOMAXILOFACIAL

M.D. Emmanuel Márquez García, D.D. Alexander Quintero Saldaña,
M.D. Luciana Martínez Martínez, M.D. María Beltrán Torres Rodríguez

Introducción

La mordida abierta anterior (BAA) es una maloclusión caracterizada por la ausencia de contacto vertical efectivo durante el cierre mandibular completo.

- Alta prevalencia.
- Incidencia global del 10-30% del total de la P.O. Etiológica

- Discrepancia dental-alveolar (D.A.) = discrepancia ósea
- Exodoncia incisivos = labio superior protruido
- Mesoposición maxilar = protrusión superior

Objetivo

Obtener la mordida funcional, la estabilidad a largo plazo y la estética estética adecuada al cierre de acuerdo de los datos clínicos.



Metodología

Paciente femenina de 27 años, exclusivamente sana, con el requisito para cirugía y fletado y con el consentimiento y consentimiento. Se realizó un diagnóstico, plan de tratamiento. Tratamiento ortodonzioquirúrgico. 1800 de días.

Tratamiento ortodonzioquirúrgico con uso de aparatología fijo (BAA) fletado superior y extrusión de primeros premolares inferiores para disminuir segmento anterior y lograr clase I canina. Control vertical mediante cara occlusal inferior y uso de elásticos intermaxilares de elasticidad fletada, fletado y control.

El segundo fletado superior fue a elongación de los primeros premolares inferiores para lograr una relación intermaxilar en clase II/1.



Resultados

Se logró el cierre de la mordida anterior mediante el uso de elásticos intermaxilares en conjunto con el tratamiento fletado ortodonzioquirúrgico para lograr funcionalidad.



Conclusiones

- El tipo de tratamiento de la mordida abierta anterior con el uso de elásticos intermaxilares en conjunto con el tratamiento fletado ortodonzioquirúrgico para lograr funcionalidad.
- El tipo de tratamiento de la mordida abierta anterior con el uso de elásticos intermaxilares en conjunto con el tratamiento fletado ortodonzioquirúrgico para lograr funcionalidad.

Bibliografía

WORLDWIDE JOURNAL OF ORTHODONTICS. www.worldwidejournal.org www.worldwidejournal.org